

Indicazioni per

Rilevare la glicemia tramite sensore alle ore 9 e alle ore 12 ed eventualmente ogni qualvolta il bambino appare stanco o poco reattivo o quando lamenta stanchezza, giramento di testa, mal di gambe.

Nel caso in cui il valore fosse **inferiore a 70 o superiore a 250**, effettuare prova glicemia con stick (destro) per verificarne l'attendibilità.

SITUAZIONE	COSA FARE
IPO-GLICEMIA valore inferiore a 70 (con destro)	Somministrare 1 bustina di zucchero o una fiala di glucosprint (se valore da 60 a 70), 2 bustine di zucchero (da 40 a 50) . Riprovare la glicemia dopo 10 min. Se valore ancora inferiore ai 70 somministrare nuovamente 1 bustina di zucchero, riprovare glicemia dopo altri 10 min e, se valore ancora basso, risomministrare 1 bustina di zucchero e chiamare i genitori. Nel caso in cui si presentasse perdita di coscienza o il bambino non fosse in grado di deglutire , somministrare il glucagone , chiamare il 112 e i genitori.
Valore inferiore a 120	Quando il valore, anche se non basso (inferiore a 120, superiore a 70), è seguito dalla freccia che scende verticalmente , dare al bambino <u>un biscotto</u> e tenere monitorata la glicemia in quanto la freccia indica che si sta abbassando rapidamente. Se il valore è tra 70 e 80 dare un biscotto, anche se la freccia è direzionata orizzontalmente.
IPER-GLICEMIA valore superiore ai 300	chiamare i genitori
ORA DI MOTORIA	No motoria se valore superiore a 250. Se valore inferiore a 120, anche se con la freccia dritta, dare un biscotto.

Tel. mamma

Tel. papà

Data

Firma genitori